

BAYFEED

Complemento dietético

para animales jóvenes

Laboratorio

BAYER

Forma farmacéutica

Polvo oral (Polv.o.)

Composición:

Dextrosa monohidrato 40%; cáscara de *Plantago ovata* (Dialina) 40%; bicarbonato de sodio 80%; cloruro de sodio 5%; citrato de sodio 3%; cloruro potásico 3%; hidróxido de magnesio 1%.

Propiedades farmacológicas

Aporte energético-electrolítico.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Terneros, Corderos, Cabritos y Potros:

- Complemento nutricional que contiene electrolitos e hidratos de carbono para la prevención y durante el tratamiento de trastornos diarreicos, pudiéndose utilizar como lactoreemplazante durante la convalecencia.
- Regula el tránsito intestinal y asegura una alimentación hídrica y energética durante períodos breves (36 a 48 horas).

Vía de administración

Oral, disuelto en agua templada o en la leche.

Posología

Corderos y Cabritos: 1/2 sobre (30 g)/litro de agua templada. Administrar 3 tomas de 200 ml de este preparado por animal, cada 12 horas. Finalmente, se administra una cuarta toma de una preparación a base de 1/4 sobre (15 g) de producto en 1/2 litro de agua + 1/2 litro de leche.

Terneros y Potros: En lugar de la leche:

- Primer día, mañana y tarde: 1 sobre (60 g) en 1,5 litros de agua templada.
- Segundo día, mañana: 1 sobre (60 g) en 1,5 litros de agua templada.
- Segundo día, tarde: 1/2 sobre (30 g) en 0,75 litros de agua templada + 0,75 litros de leche.
- Utilizar agua templada a +40 °C.

Tiempo de espera

No precisa.

Presentación

Sobre con 60 g.

Reg. N°

18.146-CAT