

# TABERNIL<sup>®</sup> DOXICICLINA

Antibacteriano  
en solución oral

## Laboratorio

---

DIVASA-FARMAVIC, S.A. (DFV<sup>®</sup>)

## Forma farmacéutica

---

Solución oral (Sol.o.)

## Composición:

---

Doxiciclina (hiclato) 100 mg; excipiente c.s.p. 1 ml.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Canarios y Aves de adorno** en general: Tratamiento de procesos infecciosos, respiratorios o digestivos causados por microorganismos sensibles. Tratamiento de clamidiasis en psitácidas. Ante cualquier proceso infeccioso es recomendable la confirmación bacteriológica del diagnóstico y la realización de una prueba de sensibilidad de la bacteria causante del proceso.

## Contraindicaciones

---

- No administrar en animales con hipersensibilidad a las tetraciclinas.
- No administrar en animales con alteraciones hepáticas.

## Efectos secundarios

---

Se han descrito casos de fotosensibilización.  
En tratamientos muy prolongados pueden aparecer alteraciones digestivas por disbiosis intestinal.

## Vía de administración

---

Oral.

## Posología

---

En el agua de bebida a razón de 50 mg de doxiciclina/kg p.v., durante 5 días consecutivos. Debe, en cada caso, establecerse el consumo medio de agua de los animales a tratar; a modo de orientación puede tomarse como consumo estándar 150 ml de agua por cada kg de p.v./día, en cuyo caso la dosis a administrar corresponderá a 7 gotas de Tabernil® Doxiciclina por cada 100 ml de agua/día.

- Para el tratamiento de la clamidiasis en psitácidas, se administrará directamente a los animales, durante 45 días seguidos, dos veces al día, la dosis de 50 mg de doxiciclina/kg p.v. (equivalente a 0,5 ml de Tabernil® Doxiciclina/kg p.v.). Esta dosis corresponde a 1 gota de Tabernil® Doxiciclina por cada 100 g de p.v. de los animales, administrada dos veces al día.
- Para una correcta dosificación es preciso pesar individualmente a los animales a tratar para establecer la dosis, tomando como base que cada gota aporta 5 mg de doxiciclina.

## Precauciones especiales

---

- No manipular el producto si existe hipersensibilidad a las tetraciclinas. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar abundantemente con agua clara.
- No fumar, comer o beber mientras se manipula el producto.
- La inflamación de la cara, labios u ojos o dificultad respiratoria son signos más graves que requieren atención médica urgente.
- Si aparecen síntomas tras exposición, como una erupción cutánea, consultar a un médico y presentar dichas advertencias.

## Observaciones

---

De uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

## Presentación

---

20 y 100 ml.

## Reg. Nº

---

1.157-ESP