

# SYNULOX 50 Comprimidos

## Apetitosos

### Antibacteriano

#### en comprimido oral

#### Laboratorio

---

PFIZER, S.A.

#### Forma farmacéutica

---

Comprimido oral (Comp.o.)

#### Composición por comprimido:

---

Amoxicilina (trihidrato) 40 mg; clavulánico ácido (clavulanato potásico) 10 mg.

#### Propiedades farmacológicas

---

Synulox 50 Comprimidos Apetitosos es una asociación de antibacterianos cuya justificación se basa en la ampliación de la actividad del espectro de la amoxicilina frente a gérmenes productores de  $\beta$ -lactamasas. La amoxicilina es una penicilina semisintética que impide la síntesis de la pared celular bacteriana por inhibición de las enzimas transpeptidasas y carboxipeptidasas, provocando un desequilibrio osmótico que destruye a las bacterias en fase de crecimiento. El ácido clavulánico es un antibacteriano inhibidor de las  $\beta$ -lactamasas con escasa acción antimicrobiana intrínseca. La inhibición que se produce es progresiva e irreversible, al formarse un complejo estable molécula-enzima. Durante este proceso el ácido clavulánico es destruido. De esta forma impide que el anillo  $\beta$ -lactámico de la amoxicilina sea roto y pueda perder actividad.

#### Interacciones e incompatibilidades

---

No administrar conjuntamente con antiinfecciosos bacteriostáticos.

#### Indicaciones y especies de destino

---

**Perros pequeños y Gatos:** Infecciones causadas por gérmenes sensibles localizadas en: tracto digestivo, tracto respiratorio, tracto urogenital, piel y tejidos blandos; así como infecciones bacterianas susceptibles a la amoxicilina en enfermedades que lo requieran.

## Contraindicaciones

---

- No administrar a animales con historial de alergia a los antibacterianos  $\beta$ -lactámicos.
- No administrar a conejos, cobayas y hámsteres.

## Efectos secundarios

---

Reacciones de sensibilización cuya gravedad puede variar desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico. Sintomatología gastrointestinal leve. Suprainfecciones por microorganismos no sensibles tras su uso prolongado. Ocasionalmente puede producir discrasias hemáticas y colitis.

## Vía de administración

---

Oral.

## Posología

---

**Perros pequeños y Gatos:** 12,50 mg/kg p.v., dos veces al día, lo que equivale a 1 comprimido/4 kg de p.v. por dosis dos veces al día.

- Se recomienda no alargar el tratamiento más de 5-7 días.

## Tiempo de espera

---

No procede.

## Modo de conservación

---

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a temperatura no superior a 25 °C.

## Observaciones

---

Con receta veterinaria.

## Presentación

---

Cajas con 10 y 100 comprimidos.

## Reg. N°

---

0842-ESP