



RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

TABERGAT COLLAR INSECTICIDA 4 MESES

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

<u>Principio activo</u>	<u>Blanco</u>	<u>Por collar</u>		
		<u>Marrón</u>	<u>Negro</u>	<u>Rojo</u>
Diazinón.....	2,325 g			
equiv. Diazinón 96%.....	2,423 g	2,423 g	2,423 g	2,423 g

Otros componentes

Cloruro de polivinilo
Dioctil ftalato
Octanoato de zinc
Estearato cálcico
Aceite de soja epoxidado
Sílice coloidal anhidra
Dióxido de titanio
Carbón vegetal
Óxido de hierro
Rojo PVC K 21.231

3. FORMA FARMACÉUTICA

Collar

4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y DATOS FARMACOCINÉTICOS

Antiparasitario externo del grupo de los organofosforados que actúa inhibiendo la colinesterasa del parásito.

En gatos es activo frente a:

- **Pulgas:** *Ctenocephalides canis*
Ctenocephalides felis
Pulex irritans

El principio activo se libera lentamente de la superficie del collar, depositándose sobre el pelaje del animal y poniéndose en contacto con el parásito. Las pulgas mueren en pocas horas.

5. DATOS CLÍNICOS

5.0 ESPECIES DE DESTINO

Gatos

5.1 INDICACIONES TERAPÉUTICAS ESPECIFICANDO LAS ESPECIES DE DESTINO

Parasitosis externas en gatos, producidas por las pulgas antes citadas.

5.2 CONTRAINDICACIONES

No usar en animales enfermos o convalecientes. No usar en animales de menos de 6 meses de edad.

5.3 EFECTOS SECUNDARIOS (FRECUENCIA Y GRAVEDAD)

Ocasionalmente, pueden producirse reacciones de hipersensibilidad cutánea.

5.4 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN

No abrir la bolsa protectora que contiene el collar hasta el momento de su uso.
Cortar cualquier exceso de longitud del collar.
Evitar que el animal muerda el collar.

5.5 USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LA LACTANCIA

No usar en hembras en lactación

5.6 INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

No administrar con otros inhibidores de la colinesterasa.
No administrar con fármacos depresores del SNC tipo fenotiazinas

5.7 POSOLOGÍA Y METODO DE ADMINISTRACIÓN

1 collar / animal durante 4 meses.

Colocar el collar alrededor del cuello del animal de forma que se puedan introducir dos dedos entre el collar y el cuello.

5.8 SOBREDOSIS (SÍNTOMAS, MEDIDAS DE EMERGENCIA, ANTÍDOTOS)

El modo de empleo del producto hace improbable una intoxicación por sobredosificación. En caso de producirse síntomas de intoxicación colinérgica (hipersalivación, vómitos, lagrimeo, respiración dificultosa...) administrar atropina y 2-PAM.

5.9 ADVERTENCIAS ESPECIALES PARA CADA ESPECIE DE DESTINO

No precisa

5.10 TIEMPO DE ESPERA

No procede

5.11 PRECAUCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD QUE HA DE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE O MANIPULE EL PRODUCTO

Evitar el contacto repetido o prolongado con la piel.
Lavarse con agua y jabón después de manipular el producto.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener el collar lejos de los alimentos

6 DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito

6.2 PERIODO DE VALIDEZ

Una vez abierto el sobre que contiene el collar, su acción dura 4 meses.
En el envase original intacto, la validez es de 18 meses.

6.3 PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el collar en la bolsa protectora herméticamente cerrada y en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

6.4 NATURALEZA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Caja de cartón conteniendo un collar en bolsa precintada de papel complejo (opalina – aluminio- polieteno).

6.5 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

DIVASA – FARMAVIC, S.A.
Ctra Sant Hipòlit km 71
08503 GURB – VIC (Barcelona)
ESPAÑA

6.6 PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO Y/O LOS ENVASES

Destruir los envases y el collar usado de forma segura.

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales

INFORMACIÓN FINAL:

- Número de autorización de comercialización: 202 ESP
- Fecha de autorización/renovación: 12 de Diciembre de 1991
- Última revisión del texto: 5 de abril de 2000
- Condiciones de dispensación: sin prescripción veterinaria

